



# 員林郭醫院暨大村復健醫院

YUAN-LIN KUO HOSPITAL and DA TSUEN REHABILITATION HOSPITAL

## 院訊

MONTHLY PUBLICATION

2012年5月

員林郭醫院 Yuan-Lin Kuo Hospital 地址/彰化縣員林鎮三民街 38-1 號 Add./38-1, SanMin St., Yuanlin, ChangHua, Taiwan  
 TEL/(04)8356878 FAX/(04)8356875 E-mail: kuo.hospita@msa.hinet.net Website:http://www.kuohospital.com.tw  
 大村復健醫院 Da Tsuen Branch 地址/彰化縣大村鄉田洋橫巷 2-9 號 Add./2-9, TianYangHeng Lane, DaTsuen, ChangHua, Taiwan  
 TEL/(04)8539666 FAX/(04)8525966 E-mail: kuo.nurse@msa.hinet.net

### 員林郭醫院 門診時間表

Yuan-Lin Kuo Hospital Service Time Table

院長：郭鐘添  
Superintendent: C. T. Kuo

外科 Surgery	診別 Clinics	星期一 Mon.	診別 Clinics	星期二 Tue.	診別 Clinics	星期三 Wed.	診別 Clinics	星期四 Thu.	診別 Clinics	星期五 Fri.	診別 Clinics	星期六 Sat.	診別 Clinics	星期日 Sun.
<b>上午 Morning 08:30am~12:00pm</b>														
甲狀腺、小腫瘤、外傷、疤痕重建、疝氣、包皮等	1	郭鐘添 C. T. Kuo	1	郭鐘添 C. T. Kuo	1	郭鐘添 C. T. Kuo	1	-	1	-	1	-	1	郭鐘添 C. T. Kuo
大腸直腸外科 Colorectal Surgery	2	莊政輝 C. H. Chuang	2	莊政輝 C. H. Chuang	2	-	2	陳復中 F. Z. Chen	2	陳漢祥 H. S. Chen	2	莊政輝 C. H. Chuang	2	-
痔瘡、肛裂、血便、便秘、大腸直腸癌、肉、大腸直腸癌	3	郭勝弘 S. H. Kuo	3	郭周彩濃 (職業病門診) T. N. Kuo Chou (Occupational Diseases)	3	郭周彩濃 T. N. Kuo Chou	3	郭周彩濃 T. N. Kuo Chou	3	郭周彩濃 T. N. Kuo Chou	3	郭周彩濃 T. N. Kuo Chou	3	郭周彩濃 T. N. Kuo Chou
<b>※ 骨科門診：週一、二、四、五上午及晚上(7點-9點) ※復健科門診：週三上午~林炯郁醫師</b>														
<b>下午 Afternoon 14:00pm~18:00pm</b>														
內科 Internal Medicine	2	陳漢祥 H.S.Chen	2	吳垂琨 C. K. Wu	2	劉裕財 Y. T. Liu	2	莊政輝 C. H. Chuang	2	陳漢祥 H.S.Chen	2	莊政輝 C. H. Chuang	2	陳漢祥 H.S.Chen
內分泌、糖尿病、高血壓、氣喘、胃腸內科等														
家醫科 Family Medicine														
<b>晚上 Evening 19:00pm~22:00pm</b>														
一般內科、症狀未明、初診篩檢、長期慢性病等	3	郭勝弘 S. H. Kuo	3	郭勝弘 S. H. Kuo	2	莊政輝 C. H. Chuang	1	郭鐘添 C. T. Kuo	2	莊政輝 C. H. Chuang	2	陳漢祥 H.S.Chen	2	陳漢祥 H.S.Chen
骨科 Orthopedics	骨	張作文 T. W. Chang	骨	張作文 T. W. Chang	3	郭勝弘 S. H. Kuo	骨	張作文 T. W. Chang	骨	張作文 T. W. Chang				
板機指、腰背痛、關節退化、骨質疏鬆、骨折等														

註：郭鐘添醫師 5/1.5/2.5/3 休診，5/3 由郭勝弘醫師看診。The consultation on 5/1.5/2.5/3 for Dr.C.T.Kuo will be closed; 5/3 substituted by Dr. S. H. Kuo  
 郭鐘添醫師 5/31 休診，由陳漢祥醫師看診。The consultation on 5/31 for Dr.C.T.Kuo will be substituted by Dr. H. S. Chen

### 大村復健醫院 門診時間表

Da Tsuen Rehab. Hospital Service Time Table

院長：郭周彩濃  
Superintendent: T. N. Kuo Chou

復健科 Rehabilitation	星期一 Mon.	星期二 Tue.	星期三 Wed.	星期四 Thu.	星期五 Fri.	星期六 Sat.	星期日 Sun.
<b>上午 Morning 08:30am~12:00pm</b>							
中風、運動傷害、五十肩、落枕、手術後復健、小兒早期療育等	林炯郁 J. Y. Lin	林炯郁 J. Y. Lin	郭勝弘 S. H. Kuo 陳律文 L. W. Chen	林炯郁 J. Y. Lin 陳漢祥 H. S. Chen 陳淑慧 S. H. Chen(約診)	郭鐘添 C. T. Kuo 吳垂琨 C. K. Wu	林炯郁 J. Y. Lin 陳漢祥 H. S. Chen	-
老人醫學科 Gerontology							
老年周全性評估、多重及退化性疾病等							
<b>下午 Afternoon 14:00pm~17:00pm</b>							
眼科 Ophthalmology	林炯郁 J. Y. Lin 楊茂仁(眼科) M. R. Yang(約診) (Ophthalmology)	詹博棋 B. Q. Zhan	吳垂琨 C. K. Wu	郭周彩濃 T. N. Kuo Chou	林炯郁 J. Y. Lin 蕭喆森(約診) J. S. Hsiao (Appo.)	陳漢祥 H. S. Chen	-
白內障、青光眼、視網膜出血破裂剝離、角膜炎等							
<b>晚上 Evening 18:00pm~20:00pm</b>							
復健 Rehabilitation	林炯郁 J. Y. Lin	復健 Rehabilitation	復健 Rehabilitation	復健 Rehabilitation	復健 Rehabilitation	-	-

註：眼科門診為 5/7 下午；腹部超音波為 5/11、5/25 下午 13:00；精神科門診為 5/31 上午；牙科門診為 5/28。以上須約診。  
 The consultation of ophthalmology is 5/7 afternoon; 5/11, 5/25 13:00 PM for Abdominal echo; 5/31 morning for Psychiatric;  
 5/28 for Dental. Please make an appointment in advance for above.

\* 求真 求善 求美 \* 以病人安全為中心、建立優質服務團隊 \*

# 中西藥合併 小心毒發



現代人講求養身，中藥、西藥、保健食品併著吃，在患病期間先後就診中西醫，並同時服用中西藥，特別是需要長期服用西藥的慢性病患，如高血壓、糖尿病、心臟病等，服用中藥時更應加倍小心，因為並非任何中西藥都能同時服用。依據中醫藥委員會的一份調查統計顯示，國人錯誤中醫藥觀念中，以輕忽中西藥交互作用者占最大宗。

\* 求真 求善 求美 \*  
以病人安全為中心、建立優質服務團隊\*

## 高血壓

降血壓藥不宜與含麻黃的中藥（如治療傷風感冒的止咳定喘丸、防風通聖丸等）合用，因為麻黃素會使血管收縮、血壓不降反升，抵銷降血壓藥的作用。而當歸會增加降血壓藥的藥效，併用時要緊密監測血壓狀況。



## 糖尿病

糖尿病患者在服用降血糖藥期間，忌服含有糖皮質激素的中藥如甘草、鹿茸、何首烏等，因這些中藥會減少人體組織對葡萄糖的利用，降低葡萄糖分解，使血糖升高，加重糖尿病病情。具降血糖功效的人蔘，若再與降血糖藥物混用，可能加重西藥降血糖劑的效果可能導致血糖過低，甚至昏迷。

## 心臟病

很多心臟病人服用抗凝血劑，若與有活血化瘀功效的當歸、川芎、丹參、紅花一起服用，會產生加乘效果，易造成皮下出血。

## 懷孕

不少婦女會在懷孕期間吃黃連解胎毒，但經研究證實，黃連會提高胎兒日後發生腦瘤、脊髓瘤的機率，孕婦絕對不能吃；至於薏仁雖然有美白、去水腫功效，是女性同胞的美容聖品，但其中的薏仁素會刺激子宮收縮，升高流產機會。



一般中西藥若可間隔 2 小時則大多數藥已由胃排空，再服用較安全。某些抗癲癇藥，血中濃度易受其它藥物影響，可考慮間隔更長時間，以免血中濃度不足致癲癇發作。抗凝血劑也須特別注意，如 warfarin 就算隔 2 或 3 小時後才服用銀杏、大蒜、當歸、丹參等，仍會增加牙齦、皮下出血的機會。等待手術的患者亦不適宜服用上述中藥以免手術中或術後流血不止。

如今臨床新藥日益增多，許多潛藏的中西藥併用禁忌尚未被發掘，因此中西藥配合須格外小心，一定要透過醫師處方！中西藥各有所長，相互配合得當，可提高療效、減少副作用、縮短療程，反之若配合不當，不但降低療效，甚至可能出現毒性，加劇病情惡化。大家千萬別自行服用來路不明的草藥，本末倒置而傷身啊！慢性病患服用中藥前，應先向醫師或藥師諮詢，謹慎服用。

# 夏夜毀容怪客隱翅

隱翅蟲通常在春、夏出沒，大多生長在草叢、田地中，清明過後，陰雨或濕熱的天氣或棲息處受到騷擾時(如整地、伐木及除草等)，活動性會更加劇烈，甚至會傾巢而出。

隱翅蟲是一種小型昆蟲，因翅膀藏匿於腹下不易察覺而得名，體態上有點像鐵青色的白蟻，腹部有黑黃色相間的環紋，身體很細長，長約 0.5 至 1 公分，寬約 0.2 公分。此蟲以腐敗的植物和動物為食，並不會螫人。隱翅蟲還有趨光習性，夜間會飛到有燈火的地方，再加上體型小，可穿過一般家庭之紗窗，即使安坐家中，還是有機會被襲擊；夏夜中在公園約會的情侶及野外活動的民眾也都是高危險群，侵害之部位主要以沒有衣物遮蔽的暴露部位為主。

隱翅蟲的毒害並非蟲體螫咬人體所致，而是由蟲體內所含之刺激性毒素「隱翅蟲素」造成的，是一種高度刺激性物質，患者皮膚接觸 10 到 15 秒就反應成壞死性紅斑，產生劇烈灼傷般的疼痛，造成以皮膚潰爛及小水泡般表現的「隱翅蟲皮膚炎」；如果不幸一巴掌把隱翅蟲打死在皮膚上，毒素更會大量擴散，形成大面積的感染。

在處理上應先以大量清水溫和地沖洗以及冰敷，以乾淨的紙巾或毛巾壓乾後，迅速就醫為宜，絕對不可以搔抓，以避免毒素擴散到其他部位，三至四天後乾涸，並在六至七天左右落屑痊癒，但可能會有一至二個月的色素沉著反應。若是處理不當，病急亂投醫或迷信偏方如：亂擦藥膏、以不當之溶液或藥劑洗滌、隨意搔抓弄破水泡及膿包，可能造成續發性的細菌感染或全身性的過敏反應，甚至蜂窩性組織炎，會留下難以磨滅的色素或疤痕。



## 避免隱翅蟲侵襲

1. 儘量不要在野外或草地上活動，不得已時請穿著遮蔽性衣物或使用驅蟲液。
2. 就寢時儘量開冷氣而不要開窗戶睡覺，若為響應節約能源，請使用蚊帳或儘量減少身體的曝露，以避免隱翅蟲侵襲。
3. 儘量熄燈就寢，以免誘蟲犯罪。
4. 看到隱翅蟲停在皮膚上時，千萬不能打死它，以免大量毒液濺出，最好用口將蟲子吹走即可。如此才能遠離隱翅蟲的毒害，讓自己有一個美好的夏天。

## 社區活動 花壇戒檳班花絮



日期: 2012 年 4 月 20 日



## 希望社會福利 慈善基金會

長期募集：

嬰兒推車、兒童汽車安全座椅，規格不限，(便於學童就學與交通)、衣物、玩具、繪本讀物或文具等。

掬一瓢奉獻的水  
讓我們的孩子  
因您的慈心而茁壯



聯絡電話：04-8536868

歡迎將捐贈物資送至

「彰化縣大村鄉(村)田洋橫巷 2-7 號」

